



REGIONE SICILIANA



LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI RAGUSA



COMUNE DI VITTORIA

DIREZIONE TERRITORIO E PATRIMONIO
SERVIZIO 3 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

Variante al PRG vigente ai sensi dell'art. 26 L.R. n. 19 del 13/08/2020 relativa alla ri-classificazione urbanistica di un'area da "zona bianca" prima destinata a "Spazi Pubblici Attrezzati a Parco per il Gioco e lo Sport" e a "G6" a z.t.o. "**Bs2**", a seguito della decadenza dei vincoli quinquennali preordinati all'esproprio, inerente il suolo sito in Vittoria, località Scoglitti, lungo la via Dei Granchi, distinto al catasto terreni del Comune di Vittoria al foglio 165 particelle 2220 sub 1 e 3320-3321-3323-3324-3326-3327 della superficie catastale di mq 279,00. Ditta: Lunetta Salvatore e Galesi Anna Maria

RELAZIONE GEOMORFOLOGICA

(D.A. N. 120 DEL 14/07/2021 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente)

FASE PRELIMINARE (B1)

Vittoria, lì

il geologo
(dott. Vincenzo La Pegna)

1. PREMESSA

E' stato effettuato lo studio geologico delle aree interessate alla *“Variante al PRG vigente ai sensi dell’art. 26 L.R. n. 19 del 13/08/2020 relativa alla ri-classificazione urbanistica di un’area da “zona bianca” prima destinata a “Spazi Pubblici Attrezzati a Parco per il Gioco e lo Sport” e a “G6” a z.t.o. “Bs2”, a seguito della decadenza dei vincoli quinquennali preordinati all’esproprio, inerente il suolo sito in Vittoria, località Scoglitti, lungo la via Dei Granchi, distinto al catasto terreni del Comune di Vittoria al foglio 165 particelle 2220 sub 1 e 3320-3321-3323-3324-3326-3327 della superficie catastale di mq 279,00. Ditta: Lunetta Salvatore e Galesi Anna Maria.*

Lo studio tiene conto delle direttive emanate dall’Assessorato Regionale T.A. con D.A. n. 120 del 14/07/2021, che impongono particolari attenzioni riguardo alle problematiche di pericolosità sismica e geologica.

Il D.A. n. 120 del 14/07/2021 dell’Assessorato Regionale T.A. ha fornito l’indirizzo per un nuovo schema di lavoro aggiornando gli strumenti legislativi alle metodologie utilizzate in campo scientifico per quanto riguarda la gestione delle pericolosità geologiche e sismiche.

La metodologia suggerita dalla circolare traccia uno schema di lavoro al quale il presente studio si è attenuto.

Per la **FASE PRELIMINARE (B1)** è stata compiuta l’analisi di tutti gli elementi di carattere geologico, geomorfologico, idrogeologico e di quanto altro consenta una valutazione oggettiva della propensione al dissesto idrogeologico e del rischio sismico.

Quindi sono state valutate le tipologie e la quantità dei processi geomorfologici ed elaborata una zonazione del territorio per aree omogenee dal punto di vista della pericolosità.

La metodologia d'indagine descritta precedentemente si esplica attraverso la raccolta di dati bibliografici, di cartografia e letteratura geologica comprendenti carte geologiche aggiornate, verifiche con rilievi di campagna e interpretazione di foto aeree e la realizzazione di una serie di mappe tematiche che illustrano le caratteristiche del territorio in studio. In particolare sono state redatte le seguenti carte di analisi:

CARTOGRAFIA DI ANALISI (B1b)

- Carta della pericolosità, scala 1: 10.000
- Carta geologica - geomorfologica, scala 1: 10.000
- Carta idrogeologica, scala 1: 10.000
- Carta PAI (Carta pericolosità e Carta dei dissesti) scala 1: 10.000
- Carta Beni Paesaggistici, scala 1: 10.000

2. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE - GEOMORFOLOGICHE

Il territorio del Comune di Vittoria fa parte di quell'unità fisiografica nota come Piana di Vittoria.

La Piana di Vittoria è ubicata ai margini occidentali dell'Altopiano Ibleo ed è, dal punto di vista geologico, costituita da una successione comprendente termini che vanno dal Miocene al Pleistocene, i quali hanno colmato una depressione strutturale conseguente ad una intensa attività tettonica distensiva che si inserisce nel più ampio contesto dell'area iblea.

Le direttrici principali della suddetta attività tettonica, relativamente al territorio del Comune di Vittoria, si possono individuare in due famiglie:

- faglie a gradinata, dirette, con andamento NNE-SSW, post-mioceniche, che hanno interessato i vari termini della Formazione Ragusa e della Formazione Tellaro, evidenti lungo gli horst di Serra S. Bartolo, Monte Calvo e Cozzo Telegrafo;

- faglie ortogonali alle prime, con andamento NW-SE, di età compresa tra il Miocene superiore e il Pleistocene.

Di seguito vengono trattati dettagliatamente i litotipi affioranti sul territorio comunale, in ordine dai più antichi ai più recenti.

I terreni **Pliocenici**, rappresentati nel territorio esclusivamente da calcari marnosi biancastri (Trubi) con stratificazione poco evidente e piani di fratturazione tra loro ortogonali che conferiscono all'ammasso una tipica struttura a "graticcio", poggiano in discordanza sulle marne della Formazione Tellaro.

Questi terreni sono stati caratterizzati da vicende deformative meno accentuate rispetto a quelli precedenti e si presentano con una struttura a pieghe.

Affiorano estesamente lungo i versanti della valle dell'Ippari e in piccoli lembi alla periferia nord-occidentale dell'abitato di Vittoria, lungo la circonvallazione S.S. 115.

Il **Pleistocene** nel territorio è rappresentato da biocalcareniti e calciruditi passanti verso l'alto e lateralmente a sedimenti lacustri, molto eterogenei dal punto di vista litotipico, con prevalenza di calcareniti travertinoidi e calcari marnosi affioranti a nord che chiudono il ciclo infrapleistocenico.

In discordanza sui termini infrapleistocenici giacciono sabbie fini giallo-rossastre, riferibili al **Pleistocene medio**, contenenti lenti argillose salmastre e livelli conglomeratici alla base. A ricoprimento delle unità sottostanti poggiano conglomerati, calcareniti e soprattutto sabbie gialle del **Pleistocene medio-superiore** che formano una serie di terrazzi marini che, nel territorio comunale degradano da quota 200 m. fino al livello del mare. Il terrazzo più recente, cartografato singolarmente, di **età tirreniana**, è rappresentato da biocalcareniti e ghiaie (Panchina) che affiorano lungo la falesia di Scoglitti.

I sedimenti **attuali e recenti** sono rappresentati da alluvioni di natura sabbioso-limosa ed in subordine ghiaiosa, le quali affiorano estesamente lungo il corso del Fiume Ippari e dei suoi principali affluenti.

Episodi di deposizione palustre sono individuabili inoltre entro il territorio in corrispondenza di depressioni morfologiche; litologicamente si tratta prevalentemente di terre nere a granulometria limoso-sabbiosa con percentuali variabili di materiale organico.

In linea generale il territorio presenta un andamento morfologico uniforme, con tratti planimetrici blandi in lieve declivio verso il mare e nella parte meridionale dai versanti della valle dell'Ippari e dei suoi principali affluenti.

Problematiche di natura geomorfologica sono connesse sostanzialmente a quattro cause:

- Elevata acclività del pendio;
- Litologia a prevalente componente argillosa;
- Erosione marina lungo la fascia costiera;
- Interventi antropici.

Le aree con acclività superiore al 35% con copertura detritica e superiore al 50% negli ammassi rocciosi, si concentrano lungo i versanti della valle dell'Ippari e dei canali Mangiauomini e Cava Albanello; queste aree sono costituite prevalentemente da sabbie e calcareniti le quali, qualora intensamente fratturate, possono originare fenomeni di crollo per erosione differenziata e per scalzamento al piede. Si tratta in ogni caso di fenomeni che non coinvolgono ampie porzioni di pendio e che si manifestano nelle zone nelle quali manca la copertura vegetale o in quelle in cui l'azione antropica ha modificato l'originario assetto morfologico (Cave dismesse, discariche, sbancamenti).

3.CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

Permeabilità

I litotipi affioranti sono stati suddivisi in cinque classi di permeabilità all'interno delle quali sono state incluse, senza alcuna differenziazione sia le tipologie primarie (permeabilità per porosità) che quelle secondarie (permeabilità per fratturazione).

Classi di permeabilità

Le cinque classi nelle quali sono stati raggruppati i litotipi cartografati sono, in ordine decrescente di permeabilità, le seguenti:

1) classe elevata:

Comprende i depositi di spiaggia ed eolici litologicamente costituiti da sabbie sciolte a grana medio-grossa; la permeabilità esclusivamente di tipo primario presenta valori compresi tra 10^{-2} e 10^{-1} m/sec.

2) classe alta:

Appartengono a questa classe i terreni sia a permeabilità primaria che mista.

I primi comprendono le sabbie fini giallo-rossastre mediopleistoceniche contenenti lenti argillose salmastre e livelli conglomeratici alla base.

Si tratta di depositi prevalentemente sciolti, a grana medio-fine, di media densità, localmente a debole cementazione carbonatica; la permeabilità presenta valori compresi tra 10^{-3} e 10^{-1} m/sec.

I terreni a permeabilità mista sono costituiti dalle sabbie con livelli calcarenitici dei terrazzi marini. Il litotipo prevalente è caratterizzato da granulometria variabile dalle sabbie fini a quelle grossolane e grado di cementazione discreto in corrispondenza dei livelli calcarenitici; la permeabilità varia tra 10^{-3} e 10^{-2} m/sec.

3) classe media:

Appartengono a questa classe depositi sciolti, semicoerenti e lapidei; i depositi sciolti comprendono le alluvioni dei subalvei dei corsi d'acqua principali costituiti prevalentemente da sabbie più o meno limose e localmente da limi e l'alternanza sabbioso-

arenitica. La permeabilità per questi terreni è di tipo primario, varia in funzione della percentuale delle frazioni fini ed è compresa tra 10^{-4} e 10^{-2} m/sec.

I depositi semicoerenti comprendono sedimenti limnici caratterizzati da litotipi eterogenei tra i quali prevalgono le facies calcarenitico-marnose; la permeabilità è di tipo misto, con prevalenza di quella primaria e presenta caratteri piuttosto variabili, in funzione della presenza di lenti limoso-marnose, pur se in generale non si discosta da valori medi compresi tra 10^{-5} e 10^{-2} m/sec.

I depositi lapidei sono rappresentati dalle calcareniti e calciruditi organogene (Calcareniti di Vittoria) dalle calcareniti dei terrazzi marini suprapleistocenici (Panchina) e dai termini carbonatici della Fm. Ragusa. Questi terreni sono caratterizzati prevalentemente da permeabilità secondaria, con valori compresi tra 10^{-4} e 10^{-1} m/sec, alla quale relativamente alla Panchina e alle Calcareniti di Vittoria si associa una discreta permeabilità primaria dovuta alla tessitura grossolana della matrice. Infine i termini gessosi, caratterizzati da permeabilità secondaria, variabile in funzione dell'azione chimica dissolutiva sulle fratture, presentano valori del coefficiente di permeabilità compresi tra 10^{-1} e 10^{-4} m/sec.

4) classe bassa:

In questa classe sono riuniti i litotipi a composizione pelitica (Fm. Trubi e depositi palustri); la permeabilità è sempre molto bassa, anche se in corrispondenza di zone tettonicamente disturbate a composizione prettamente marnosa, si possono sviluppare locali circuiti legati alla fratturazione dell'ammasso roccioso in cui si possono registrare i valori leggermente più alti.

5) classe bassissima ed impermeabile:

Questa classe comprende i termini argillosi e argilloso-marnosi delle Argille azzurre e delle argille marnose e marne della Formazione Tellaro; questi termini rappre-

sentano il substrato impermeabile della falda superficiale e della falda intermedia confinata; sono state inserite inoltre in questa classe le aree urbanizzate nelle quali non vi è infiltrazione nel sottosuolo.

Assetto idrogeologico

In relazione alle caratteristiche litologiche e di permeabilità delle diverse formazioni affioranti nel territorio, ai relativi rapporti stratigrafici, al loro assetto strutturale e all'estensione e spessore dei depositi possono essere schematicamente distinti i seguenti sistemi acquiferi:

- acquiferi in falda libera nei depositi quaternari, calcarenitico-sabbiosi, costieri e alluvionali;
- acquifero in pressione nella serie gessoso-solfifera;
- acquifero in pressione nella successione carbonatica della Formazione Ragusa.

Il complesso calcarenitico-sabbioso, il più rappresentato arealmente nel territorio, costituisce un sistema acquifero di tipo libero, monostratificato a grande scala, mentre a scala locale può essere considerato un multistrato per la presenza di diaframmi semi-permeabili; lo spessore complessivo varia tra 120 e 130 metri.

Possiede permeabilità di grado medio-alto, di tipo misto, primario laddove prevalgono le litologie sciolte o debolmente cementate, secondario in corrispondenza dei termini prettamente calcarenitico-calcirudinitico, dove la permeabilità risulta accentuata, oltre che dalla fratturazione, dalla presenza di canalizzazioni carsiche.

Il substrato impermeabile è dato quasi sempre dalle marne della Formazione Telaro, e solo localmente dai Trubi.

La falda si rinviene a quote s.l.m. comprese tra -10 m e 200 m, con valori di soggiacenza variabile da pochi metri ad un massimo di 50 m.; è alimentata sia dall'apporto diretto delle precipitazioni sia localmente dalla falda presente nell'acquifero carbonatico

profondo per interconnessione; un interscambio inoltre, può realizzarsi con la falda freatica del subalveo dei principali corsi d'acqua.

Le potenzialità un tempo elevate, attualmente si sono molto ridotte per l'eccessivo sovrasfruttamento; solamente in quelle aree in cui riceve apporti dalla falda carbonatica consente emungimenti di rilievo. La principale direzione di deflusso sotterraneo è orientata in senso NNE-SSO. All'interno del perimetro urbano, in corrispondenza degli affioramenti sabbiosi la falda, si rinviene a profondità molto prossime alla superficie, data la morfologia del substrato impermeabile, che in queste aree è stato rialzato a seguito di stress tettonici. La falda contenuta nei depositi costieri e nelle alluvioni dei principali corsi d'acqua, dato il loro modesto spessore, ha un interesse idrogeologico modesto e solo localmente di un certo significato (valle dell'Ippari caratterizzate dall'interscambio con l'acquifero calcarenitico-sabbioso e/o carbonatico).

L'acquifero contenuto nella serie gessoso-solfifera dal punto di vista idraulico è caratterizzato da valori di permeabilità molto variabili nell'ambito della formazione stessa in funzione della porosità e, soprattutto, del grado di fratturazione dei tipi litologici in essa presenti e di eventuali processi dissolutivi dovute alle acque circolanti.

4. PRESCRIZIONI

Il presente lavoro, redatto in conformità alle linee guida del D.A. n. 120 del 14/07/2021 dell'Assessorato Regionale T.A., ha consentito di elaborare una serie di cartografie allegate che ha permesso di poter evidenziare l'assenza di particolare problematiche dal punto di vista geomorfologico dell'area agli interventi in progetto.

Si prescrive l'esecuzione di adeguata indagine da realizzare all'interno del lotto al fine di accertare le caratteristiche geologiche dell'area ed in particolare l'individuazione dei litotipi presenti.


Vittoria,


geol. Vincenzo La Pegna

ALLEGATI

I.G.M. B1b

(SCALA 1:25.000)

 = UBICAZIONE SITO



CARTA DELLA PERICOLOSITA' (SCALA 1:2.000)

B1b

CLASSE I



Aree edificabili
(pericolosità geologiche e sismiche tali da non imporre limitazioni alle scelte urbanistiche, nel rispetto del D.M. 11/03/88 e della L. 64/74)




STRALCIO P.R.G.

REGIONE SICILIA
COMUNE DI VITTORIA
 PROVINCIA DI RAGUSA

STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DELLA
 REVISIONE DEL P.R.G.

CARTA GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICA



Ttr
 Terrazzi marini (Parchina): calcareniti e sabbie carbonatiche
 bianco-giallastre con livelli conglomeratici cementati (PLEISTOCENE
 SUPERIORE)

Tm
 Terrazzi marini: sabbie giallastre con livelli arenifici (PLEISTOCENE
 MEDIO)

B1b

SCALA 1:40000



SITO

- Terreni ad elevata permeabilità per pozzi (S₁-S₂)
- Terreni ad alta permeabilità per pozzi (T₁ - Q_{ms} - Q_s)
- Terreni a media permeabilità per pozzi e infiltrazione (A - T₁ - O₁ - O₂ - O_s - M_g - M_{nc})
- Terreni a bassa permeabilità (P - P₁)
- Terreni a bassissima permeabilità, impermeabili ed aree urbanizzate (Q₁ - M₁)


Foglie (in tutti i rami) (Lato Romano)

Linee isopiezometriche e relative quote (in s.l.m.) della sabbia superficiale

Linee isopiezometriche e relative quote (in s.l.m.) della sabbia intermedia confinata (acquifero del Grotto)

Linee isopiezometriche e relative quote (in s.l.m.) della sabbia profonda confinata (acquifero della successione calcareosa della Fm. Soglio)

Direzione di declinso profondo



B1b




Regione siciliana
Assessorato Regionale dell'Ambiente
Assessorato Regionale Territoriale di Palermo
Assessorato Regionale Territoriale di Siracusa

**Piano Stralcio di Bacino
per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)**
Bacino Idrografico del Fiume Ippari ed aree
comprese tra il bacino del F. Acate-Dritto e
il Bacino del F. Irminto




**CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA
PER FENOMENI DI ESONDAZIONE N° 12**



Anno 2006

LEGENDA

- P1 Pericolosità moderata
- P2 Pericolosità media
- P3 Pericolosità elevata
- Siti di attenzione
- Limiti bacino idrografico del F. Ippari
- Limiti area intermedia
- Limiti comunali



B1b

REPUBBLICA ITALIANA

Ragione Siciliana
 Assessorato Territorio e Ambiente
 Direzione Regionale Territorio e Ambiente
 Ufficio Regionale Territorio e Ambiente

**Piano Stralcio di Bacino
 per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)**
 Bacino Idrografico del Fiume Ippari ed aree
 comprese tra il bacino del F. Acate-Diritto e
 il bacino del F. Irimino

CARTA DEI DISSESTI N° 12
 Foglio V.10
 Scala 1:10.000
 Anno 2006

LEGENDA


FENOMENI FRANOSI

- Orto ed risarcimento
- Colamento rapido
- Colamento lento
- Scorrimento
- Scorrimento
- Piana compressa
- Separazione laterale o deformazione gravitativa (ODP/L)
- Colamento lento
- Area a nascita artificia
- Deformazione superficiale area
- Clacivio
- Classi compatibili ad ambiente naturale


STATO DI ATTIVITA'

- Attivo
- Inattivo
- Quiescente
- Disattivato artificialmente o restaurato

Limite bacino idrografico del F. Ippari
 Limite area intermedia
 Limite comunale



B1b



Legenda

- Confine comunale
- - - Confine provinciale
- D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. a) Intervalle ed aree di controllo, servitù pubblica, sottoposizione a vincolo paesaggistico ex art. 136 (D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 142)
- D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134, lett. b) - aree di cui all'art.142
- Interventi condotti compresi in un'area di 100 m. dalla linea di delimitazione
- Territori contigui a quelli compresi in una fascia di 300 m. dalla linea di delimitazione
- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua a valle della grande pieve con bacini di 100 ha
- Area protetta (Riserva regionale)
- Interventi ricoperti da fossato e dai boschi o adossati a muro di rettificamento
- Area a rischio di inondazione in pianura
- D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. c) Interventi ammessi ed aree sottoposti dal Piano a specifici vincoli di tutela e valorizzazione ex art. 143 (art.143 D.lgs. 42/2004 e s.m.i.)
- area cui sottostare il vincolo

PROVINCIA DI MESSINA
Piano Paesaggistico
15 - 16 - 17

Scale 1:25.000

3b

Tavole di Piano
15 - Pianure costiere di Licata e Gela
16 - Colline di Carlagiarone e Vittoria
17 - Rilievi e Tavolato Ibleo

B1b

Beni paesaggistici